

# **Клинические исследования: Препарат ГЕСАВИТ 50 БГ**

Акушерско-гинекологическая клиника Факультативной больницы  
Карлового Университета, Пльзень

Аллея Свободы 80  
323 00, Пльзень

Заведующий клиники: Дос. MUDr. Зденек Рокита, CSc.

Координатор исследования: MUDr. Владимир Кокеш

Продолжительность исследования:

От 28.5.2009 до 22.3.2010.

## **Количество пациенток:**

Было исследовано 120 пациенток с гинекологической злокачественной опухолью.

## **Разделение и количество пациенток согласно величине дневной дозы:**

### **70 пациенток**

- после лечения опухолевого заболевания в комплектной ремиссии заболевания – **2 капсулы в день**
- **32 пациентки** после лечения опухолевого заболевания с повышенным риском (элевация tumor- маркеров, с high-risk гистологическим обнаружением при предыдущем заболевании или данном неясном объективном диагнозе, – **3 капсулы в день**

**18 пациенток** с признаками рецидива или прогрессии заболевания – **4 капсулы в день**

## **Разделение пациенток согласно диагнозу заболевания:**

С 52 Злокачественная опухоль влагалища:	1 пациентка
С 53 Злокачественная опухоль шейки матки:	33 пациенток
С 54 Злокачественная опухоль матки:	46 пациенток
С 56 Злокачественная опухоль яичника:	37 пациенток
С 57 Злокачественная опухоль яйцевода:	3 пациентки

**Всего: 120 пациенток**

## **Результаты:**

Абсолютное большинство пациенток положительно оценивали свои ощущения и эффективность препарата ГЕСАВИТ 50 БГ.

У данных пациенток не были зарегистрированы какие-либо нежелательные побочные явления.

Не была выявлена аллергическая реакция, у большинства пациенток объективные лабораторные результаты после лечения стабилизировались. Несколько пациенток одновременно констатировало улучшение иммунной ситуации относительно стойкости к вирусным заболеваниям.

В процессе применения препарата пациентки чувствовали себя хорошо.

У одной пациентки исчезли пищеварительные проблемы.

## **Нежелательные проявления при применении препарата ГЕСАВИТ 50 БГ:**

1. У одной пациентки одновременно с применением препарата заболевание **прогрессировало с образованием метастазы в кожном покрове пупочного рубца.**

Речь шла о 45-летней пациентке с диагнозом: **карциносаркома яичника** – очень высокий, рискованный гистологический тип заболевания.

Пациентка принимала по 3 капсулы в день.

2. У одной пациентки был зарегистрирован **рецидив заболевания** и связанная с этим рвота у 54-х летней пациентки с диагнозом: **серозная аденокарцинома яичника** – также высокорискованный гистологический тип заболевания.

Пациентка принимала по 4 капсулы в день.

**У обеих двух упомянутых пациенток, у которых был выявлен рецидив или прогрессия заболевания, речь шла о высокоагрессивном и рискованном гистологическом типе опухолевого заболевания.**

## **Заключение:**

**У оставшихся 118 пациенток, как указано выше, не были выявлены какие-либо негативные ощущения или проявления. Все эти пациентки были абсолютно довольны данным препаратом и положительно оценивали воздействие тестируемого препарата ГЕСАВИТ 50 БГ.**

г. Пльзень, 22.3.2010 г.

MUDr. Владимир Кокеш

координатор исследования

Doc. MUDr. Зденек Рокита, CSc.

заведующий клиники