

Стандартная химиотерапия в комбинации с ГЕСАВИТ 50БГ

Номер больного 8

Ф.И.О. больного Харатрен Володя

Номер паспорта АА02 994444

Номер истории 358/34

Морфологический диагноз п16079/09 умеренно-диф-  
ференцированная аденокарцинома

Клинический диагноз С-2 перитонеального утолщения толстой  
кишки, с/п наложением разгрузочной шео-

TNM классификация Т 4 N 1 M 0 II ст. еголия

Дата начала лечения 19.02.09

Дата окончания лечения \_\_\_\_\_

Пол ☒ муж. ☐ жен.


Возраст 19.03.1958г

Рост 1,70 см

Вес 69

\_\_\_\_\_ капсул в день - 60 дней, итого 6 упаковок N 30

Ф.И.О. врача Днеднел Нанра Меловна

Подпись врача 

Подпись больного \_\_\_\_\_

## Тип опухоли и размер

1. Локализация, размер первичной опухоли перитонейный узел  
толстой кишки 15x15 см, ограничен, подвижен,  
сужает просвет кишки, с вограм. периф. прорастанием

2. Клинические симптомы / физикальное обследование боль в животе  
справа наложена разгрузочная диета

### 3. Гистология

☐ рак легкого

☐ рак молочной железы

☒ рак толстой кишки

☐ рак шейки матки

☐ рак

☐ рак

| Иммунный статус больного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| До химиотерапии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | После химиотерапии                                                                          |
| <p>Т-лимф. - 40%<br/>абс. - 616 мкл.</p> <p>Т-хелперы 23%<br/>(CD4)+ абс - 345 мкл.</p> <p>Т-супрессоры<br/>(CD8+) 15%<br/>абс - 225 мкл</p> <p>индекс регул. иммун.<br/>(CD4+ / CD8+) - 1,5</p> <p>Замеч. снижение<br/>показателей Т-клеточ-<br/>ной иммунореак-<br/>тивности.</p> <p>Рез. иммуноран - 15<br/>показаний, через день<br/>показатель - 3<br/>индекс через день</p> | <p>Замеч. показатели<br/>Т-клеточной<br/>иммунореактив-<br/>ности в пределах<br/>нормы.</p> |



### Общий анализ крови

Тромбоциты  $230,0 \times 10^9/\text{л}$  —  $200,0 \times 10^9/\text{л}$

Лейкоциты (расшифрованные)  $6,8 \times 10^9/\text{л}$  —  $5,0 \times 10^9/\text{л}$

Нейтрофилы <sup>4</sup> патологическое — 3, сегментояд. — 63

Гемоглобин  $107,0 \text{ г/л}$  —  $88,0 \text{ г/л}$  — 63

Ретикулоциты лимфоцитоз — 25 — 22

Другие СОЭ —  $36 \text{ мм/ч}$ , лимфоциты — 29 — СОЭ —  $34 \text{ мм/ч}$   
моноциты — 3

### Биохимический анализ

Мочевина  $3,5 \text{ ммоль/л}$  —  $4,1 \text{ ммоль/л}$

Билирубин  $6,2 \text{ мкмоль/л}$ , прямой — 1,2 — (6,4)  
непрямой — 5

Время протромбина  $10''$  —  $10''$

AST / ALT  $12 / 6$  —  $146 / 91,3$

Na<sup>+</sup>  $140 \text{ ммоль/л}$  —  $140 \text{ ммоль/л}$

K<sup>+</sup>  $4,1 \text{ ммоль/л}$  —  $4,0 \text{ ммоль/л}$

Cl<sup>-</sup>  $101 \text{ ммоль/л}$  —  $100 \text{ ммоль/л}$

Ca<sup>++</sup> (общ.)  $2,11 \text{ ммоль/л}$  —  $2,18 \text{ ммоль/л}$

Другие фибриноген —  $488 \text{ мг\%}$  —  $400 \text{ мг\%}$

### ЭКГ

синусовый ритм, 95 уд/в', рубцовые  
изменения миокарда, задней стенки  
левого желудочка, умеренное  
изменение миокарда.

Данные субъективных исследований (повышение тонуса, самочувствие, жизнеспособность, аппетит и т. д.)

Общее состояние больного по шкале Карновского 80%. Больной активен, аппетит в норме, стул оформленный, неослабленные утруднения

**Вывод;** Объективное заключение специалистов о лечебных свойствах и усвояемости препарата ГЕСАВИТ 50 БГ при лечении онкологических заболеваний

Эффект лечения оценивается как стабилизация процесса переносимости ЖТ на фоне приема препарата утруднения, отмечалось повышение АД до 160/80 мм рт. ст. в день введения химиопрепаратов. (У б-го в анамнезе ИБС, состояние после АКШ) Клинико-патологический статус нормализовался.